

انجماد (فریز) جنین به چه معناست؟

در هر سیکل درمان آی - وی - اف چندین تخمک برداشت می شود که احتمال دارد تمامی این تخمک ها به جنین های خوبی تبدیل شوند. در هر سیکل انتقال جنین حداکثر ۳ جنین به رحم منتقل می شود. در صورتی که سایر جنین ها با کیفیت مناسبی داشته باشند می توان آنها را منجمد کرد. اگر در سیکل فعلی درمان حاملگی رخ ندهد، در سیکل های بعدی جنین های منجمد شده مجددا ذوب می شوند و در صورتی که کیفیت خوب خود را حفظ کرده باشند، به رحم منتقل می شوند. در این صورت دیگر نیاز نیست بیمار مراحل پرهزینه تحریک تخمک گذاری و عمل برداشت تخمک را انجام دهد. نتایج حاصل از انتقال جنین های منجمد شده مشابه سیکل های با انتقال جنین تازه است. بیماران محترم باید توجه داشته باشند انجام آزمایش اچ آی وی و هپاتیت برای انجماد جنین در این مرکز الزامی است. در غیر این صورت انجام انجماد امکان پذیر نمی باشد. بنابراین بهتر است بیماران قبل از عمل برداشت تخمک، برای انجام آزمایشات نامبرده اقدام کنند.

برای انتقال جنین های فریز شده بیمار باید چه اقداماتی انجام دهد؟

وقتی که بیمار تصمیم می گیرد از جنین های منجمد شده خود استفاده کند، باید جهت برنامه ریزی با کلینیک و پزشک معالج خود مشورت کند. پزشک معالج برنامه دارویی لازم را به بیمار ارائه می کند. لازم است بیمار در روز تعیین شده برای انجام سونوگرافی و بررسی های بیشتر به مرکز مراجعه کند. بقیه دستورالعمل ها مانند موارد گفته شده در مورد انتقال جنین تازه است.