

سوالات آزمون بهورزی واحدهای مبارزه با بیماریها وبهداشت خانواده آذر ماه ۱۳۹۳

۱- دوره کمون بیماری ایدز چقدر است؟

الف: ده سال * ب: دوماه تا ده سال ج: یک ماه تا سه ماه د: چهارماه تا ده سال

۲. کدامیک از موارد ذیل راه انتقال بیماری ایدز نمی باشد؟

الف: تزریق خون ب: مادر به کودک ج: تماس جنسی * د: تماسهای اتفاقی محیطی و روبروسی

۳. در حال حاضر بیشترین راه انتقال ویروس ایدز در ایران کدام است؟

الف: دریافت خون آلوده * ب: معتادان تزریقی ج: تماس جنسی محافظت نشده د: مادر به کودک

۴. بالاترین احتمال بروز عفونت ثانویه به ویروس ایدز به ترتیب در کدامیک از راه های انتقال زیر دیده می شود؟

الف: تزریق خون آلوده < تماس جنسی < مادر به کودک < تزریق با سرنگ آلوده

ب: تزریق با سرنگ آلوده < تماس جنسی < تزریق خون آلوده < مادر به کودک

* ج: تزریق خون آلوده < مادر به کودک < تماس جنسی < تزریق با سرنگ آلوده

د: تزریق خون آلوده < مادر به کودک < تزریق با سرنگ آلوده < تماس جنسی

۵. کدامیک جزو نحوه مراقبت خانم حامله HIV+ نمی باشد؟

* الف: سزارین احتمال انتقال بیماری ایدز را کاهش نمی دهد

ب: در CD4 کمتر از ۲۰۰ باید درمان پروفیلاکسی را آغاز کرد

ج: در یک مادر HIV+ سقط درمانی اقدام مناسبی است

د: برای پیشگیری از انتقال عمودی در حاملگی، زایمان و پس از آن درمان پروفیلاکسی لازم است.

۶. قابلیت سرایت عفونت ناشی از ایدز چه مدت می باشد؟

الف: دوماه ب: ده سال ج: دوماه تا ده سال * د: شروع عفونت تا پایان عمر

۷. کدام جمله صحیح است؟

الف: شیر دهی در افراد HIV+ توصیه نمی شود. ب: مصرف داروی رتروویروسی احتمال انتقال ایدز را کاهش می دهد.

ج: سزارین احتمال انتقال بیماری ایدز را کاهش می دهد. * د: همه موارد

۸. از لحاظ اپیدمیولوژی، کشور ایران جزو کدام مناطق شیوع هیپاتیت B می باشد؟

- الف: مناطق با شیوع کم (۰/۱-۳) درصد
ب: مناطق با شیوع کم (۰/۱-۲) درصد
ج: مناطق با شیوع متوسط (۲-۸) درصد
د: مناطق با شیوع بالا (۲۰-۸۰) درصد ❀

۹. اگر سوزن آلوده به ویروس هیپاتیت B به دست پرسنل فرو رود چه باید کرد؟
الف: اگر واکسیناسیون کامل باشد و تیتراژ آنتی بادی کمتر از ۱۰ باشد سه نوبت واکسن با دوز دوبرابر تزریق شود.
ب: اگر واکسیناسیون انجام نشده است تزریق HBIG در فاصله ۷۲ ساعت لازم است.

- ❀ ج: اگر واکسیناسیون انجام نشده است تزریق HBIG و یک دوره کامل واکسن الزامی است.
د: انجام سه نوبت واکسیناسیون با دوز دوبرابر.

۱۰. نوزادی از یک مادر آلوده به HBV به دنیا آمده است، توصیه شما درباره نوزاد چیست؟

- الف: انجام واکسیناسیون بلافاصله و تزریق HBIG فقط تا ۱۲ ساعت بعد از زایمان
❀ ب: انجام واکسیناسیون و تزریق HBIG در اسرع وقت (ترجیحاً در ۱۲ ساعت اول)

ج: تزریق واکسن به تنهایی
د: تزریق HBIG به تنهایی و حداکثر طی ۴۸ ساعت

۱۱. فردی در گروه پزشکی سه ماه پس از دریافت آخرین نوبت واکسن هیپاتیت B سطح /آنتی بادی زیر ۱۰ IU/ml داشته است. اقدام شما چیست؟

- الف: تزریق یک نوبت واکسن با دوز معمول
ب: تزریق یک نوبت واکسن با دوز دو برابر
❀ ج: تزریق سه نوبت واکسن با دوز معمول
د: تزریق یک نوبت واکسن و اندازه گیری دوهفته بعد تیتراژ آنتی بادی

۱۲. هدف از انجام واکسیناسیون هیپاتیت B کدامیک از موارد زیر می باشد؟

- الف: پیشگیری از ایجاد عفونت مزمن
ب: پیشگیری از مرگ های ناشی از هیپاتیت B
ج: جلوگیری از سیروز و کانسر کبد
❀ د: همه موارد

۱۳. منظور از عفونت پری ناتال چیست؟

- الف: انتقال عفونت از مادر به نوزاد در دوران حاملگی
ب: انتقال عفونت از مادر به نوزاد بعد از زایمان
ج: انتقال عفونت از مادر به نوزاد حین زایمان
❀ د: همه موارد

۱۴. در دوران سالمندی نیاز به کدام یک از موارد زیر افزایش می یابد .

الف) کربوهیدرات ب) انرژی ج) چربی د) پروتئین *

۱۵. کدام بیماری افراد سالمند رامستعد کمبود ویتامین ب ۱۲ می کند

الف) پوکی استخوان ب)نقرس ج)ورم معده د) دیابت

۱۶.مهمترین علت بوی بد دهان کدام است

* الف) پوسیدگی و بیماریهای لثه ب) سینوزیت ج) دیابت د)زبان شیار دار

۱۷.سالمندی که مدتی است دچار ضعف و ناتوانی شدید شده به احتمال زیاد دچار چه بیماری است؟

الف)پارکینسون ب) آلزایمر ج) سوءتغذیه د) فراموشی

۱۸.مصرف کدامیک از خوراکیهای زیر باعث بروز بیوست می شود ؟

* الف) محصولات لبنی پرچرب ب)حبوبات ج)گل کلم وگیلاس د) همه موارد

۱۹-کدامیک از افراد زیردر معرض خطر دیابت نمی باشند ؟

الف) افرادی که اضافه وزن دارند ب)افرادی که پدر ، مادر ، خواهر ویا برادر آنها سابقه ابتلا به دیابت دارند

ج)زنانی که سابقه دیابت بارداری دارند . د) افرادی که فشار خون ۱۴/۸ دارند *

۲۰.کدام یک از باورهای زیر در مورد جذب کلسیم صحیح است .

* الف)داروی ضد اسید معده جذب کلسیم را کاهش میدهد ب)افزایش مصرف چربیها باعث جذب بهتر کلسیم می شود

ج) افزایش مصرف پروتئین های حیوانی جذب کلسیم را افزایش می دهد . د) جذب کلسیم با افزایش سن افزایش مییابد .

موفق وموید باشید