

آگاهی مراقب سلامت از تعاریف بیماری التور

مورد مشکوک به التور:

- هر فرد ۲سال وبالاتر مبتلا به اسهال حاد آبکی شدید یا متوسط در تمام فصول سال
  - مرگ از اسهال
  - هر مورد طغیان بیماری اسهال آبکی(افزایش ناگهانی موارد بیماری)در منطقه صرف نظر از سن یا شدت بیماری
- حداقل نمونه گیری التور در طول یک سال در جمعیت تحت پوشش:

چهار درصد کودکان زیر ۵ سال.مثلا مرکزی با جمعیت ۱۰۰۰ کودک زیر ۵ سال بایستی حداقل ۴۰ نمونه در سال داشته باشد.

وسایل لازم جهت نمونه گیری التور:

محیط کشت کری بلر ،باکس نمونه گیری جهت ارسال نمونه به آزمایشگاه،(فرم شماره ۳ مراقبت التور)فرم نمونه برداری روزانه بیماری اسهالی وفرم گزارش آزمایشگاه

اقدامات مراقبتی مراقب سلامت در کنترل بیماری التور

این اقدامات شامل (بررسی و گزارش موارد،بررسی موارد تماس و جمع آوری وانتقال نمونه)هاست که شرح آن به تفکیک شامل موارد ذیل میباشد.

۱-پیگیری ویزیت شخص مشکوک به التور توسط پزشک مرکز وگرفتن شرح حال

۲-آموزش پزشک در رابطه بارجاع بیمار به مراقب سلامت مرکز در صورت وجود علائم خاص مشکوک به بیماری التور(اسهال حاد آبکی) جهت نمونه گیری واقدامات بعدی

۳-بررسی افراد خانواده بیمار توسط مراقب سلامت مرکز

۴-آموزش شرح کاملی از نحوه نمونه گیری به شخص بیمار و راهنمایی وی جهت قراردادن نمونه در ظرف مورد نظر در سرویس بهداشتی

۵-همراهنگی جهت تحویل نمونه به مرکز رفرنس (مرکز نیکوپور)به همراه فرم مربوطه

۶-ثبت بایگانی فرم ارسال شده در دفتر التور وگزارش ماهیانه آن به مرکز بهداشت شهرستان

۷-درخواست به موقع محیط کشت کری بلر جهت مرکز

