

نظام مراقبت بیمار مشکوک به فلج شل حاد:

آگاهی مراقب سلامت از تعریف بیمار مشکوک به فلج شل حاد

تعریف مورد مشکوک به فلج شل حاد:
هر بیمار مبتلاء به فلج شل ناگهانی بدون سابقه قبلی یا ضربه از جمله هر کودک زیر ۱۵ سال با تشخیص گیلن باره یا هر مورد مظنون به فلج اطفال درهرسنی.

اقدامات مراقبتی، مراقب سلامت در کنترل بیماران مشکوک به فلج شل حاد

- ۱- شناسایی افراد مشکوک به بیماری که مبتلا به فلج شل ناگهانی بدون سابقه قبلی یا ضربه شده اند.
- ۲- گزارش دهی فوری و تلفنی به واحد مبارزه مرکز بهداشت شهرستان طبق فرم خطی بیماری
- ۳- ارجاع فوری بیمار به مرکز تخصصی
- ۴- تکمیل دقیق فرم لیست خطی بیماری
- ۵- تکمیل دقیق فرم بررسی بیماری
- ۶- بررسی اپیدمیولوژی بیماری (درخصوص بررسی بیماری در اطرافیان بیمار و بررسی واکسیناسیون آنها)
- ۷- شناسایی بیماری تا ۷ روز بعد از بروز علائم باید صورت گرفته باشد .
- ۸- گرفتن دو نمونه مدفوعی، بفاصله ۲۴ ساعت (با توجه به دفع حداکثری ویروس در مدفوع بیمار در ۲ هفته اول ابتلا، گرفتن نمونه ها بایستی تا ۱۴ روز بعد از بروز علائم انجام شده باشد)
- ۹- ارسال نمونه ها با حفظ زنجیره سرما به مرکز بهداشت شهرستان
- ۱۰- پیگیری روز ۶۰ برای تمام بیماران مشکوک به فلج شل حاد
- ۱۱- ثبت بیماری در سامانه سیب و پیگیری مراقبت های بیمار تا پایان دوره درمان به صورت کامل