


داروهای ضد بارداری خوراکی

Oral contraceptive pills (OCP)



قرص ضد بارداری توسط افراد زیر نباید استفاده شود:

- زنان حامله
- افراد چاق
- افراد مبتلا به سرطان سینه یا رحم
- افراد مبتلا به بیماریهای کبدی یا مشکلات کیسه صفرا
- افراد مبتلا به ترومبوز، سکته مغزی یا مشکلات قلبی
- افراد مبتلا به میگرن شدید به ویژه با علائم هورمونی
- افراد مبتلا به دیابت به مدت حداقل ۲۰ سال یا دیابت با عوارض
- افراد سیگاری بالای ۳۵ سال یا هر کسی که در سال گذشته سیگار کشید و بیش از ۳۵ سال دارد
- افرادی که در اعضای درجه یک خانواده قبل از سن ۴۵ سالگی لخته خون

روش های بسیار دیگری برای جلوگیری از بارداری وجود دارند که پزشک تان می تواند به شما توصیه کند، به خصوص اگر عوارض جانبی قرص ضد بارداری برای شما شدید است.

عوارض مصرف
Contraceptive LD,HD,Triphasic,
LEVONORGESTREL,
Cyproterone COMPOUND ,
ESTRADIOL VALERATE

عوارض مصرف
Conjugated Estrogens

تهوع و استفراغ
سفتی و بزرگ شدن پستان
سندرم پیش از قاعدگی
یرقان ناشی از بند آمدن صفرا
بثورات جلدی و کلوآسما
افسردگی
سردرد
افزایش غلظت فاکتورهای انعقادی
بروز ترمبو آمبولی و آمبولی ریوی
حمله و سکته قلبی
افزایش یا تشدید فشار خون

بروز ترمبو آمبولیسم وریدی
بثورات جلدی و ملاسما
ورم و افزایش حساسیت پستان ها
افزایش شیوع بیماری های صفراوی و تشکیل سنگ کیسه صفرا
تهوع و استفراغ
سردرد
آکنه و پرمویی
افزایش وزن
تغییراتی در میل جنسی
افسردگی
الیگومنوره (خون ریزی سبک ، کم تکرار یا غیر طبیعی)
منوراژی (خون ریزی شدید یا طولانی)
نامنظم شدن قاعدگی