



عوارض ناشی از مصرف داروهای تزریقی

آیا میدانید :

- در ایران، میزان مصرف سرانه داروهای تزریقی در سال ۴ برابر میانگین جهانی است. این در حالی است که تزریقات، به تنهایی و جدای از عوارض دارو، خود فرآیندی خطرآفرین است.

- در میان مردم این تصور وجود دارد که فرآورده های تزریقی به مراتب بهتر از داروهای خوراکی هستند. اما متخصصان با این نظر مخالفند و از تزریق به عنوان یک روش تهاجمی با خطر فوق العاده بالا نام می برند که در سیستم درمان سرپایی ضرورتی ندارد و این روش را مخصوص درمان های اورژانس و یا زمانی که از راههای دیگر بویژه راه خوراکی نمی توان استفاده نمود، می دانند.

- بیش از ۵۰٪ عوارض به ثبت رسیده در مرکز **ADR** ناشی از مصرف داروهای تزریقی بوده است. اکثر اوقات عوارض جانبی داروهای تزریقی نسبت به داروهای خوراکی بیشتر است و نباید به پزشک جهت تجویز داروی تزریقی اصرار کرد.

- آبنه ، عفونت و ابتلا به بیماری های ویروسی و میکروبی از عوارض تزریق هستند.

نتیجه گیری :

جز در موارد استثناء، هیچ یافته قطعی مبنی بر این که روش تزریقی بر مصرف خوراکی داروها ارجحیت دارد،

وجود ندارد بلکه معایبی چون درد، احتمال ورود اتفاقی سوزن به بدن، امکان انتقال عفونت، هزینه درمانی بالا ، نیاز به افراد کارشناس جهت تزریق، عدم امکان حذف دارو در صورت تزریق بیش از حد، ایجاد آبنه در محل تزریق و... را نیز دارد.

بدانیم که داروهای تزریقی برای زمان هایی است که اثر سریع درمانی ضروری است، یا بیمار قادر به مصرف داروی خوراکی نیست، یا مواردی که دارو در صورت مصرف از راه خوراکی از بین رفته و بی اثر می شود و یا از دستگاه گوارش قابل جذب نمی باشد و استفاه از آن در سایر موارد چندان موجه و منطقی نیست.

داروهای مشابه :

در مورد داروهای مشابه ، باز هم اولویت با داروی خوراکی است؛ مثلا اگر دارویی هم به صورت آمپول و هم به صورت قرص و کپسول موجود باشد، توصیه ما این است که بیمار حتی الامکان داروی خوراکی را مصرف کند، زیرا هر تزریقی می تواند یک واکنش به همراه داشته باشد و بروز حساسیت از جمله مهم ترین عوارض داروهای تزریقی است. در صورت بروز حساسیت دارویی در قرص و کپسول و شربت، می توان مصرف آن را بلافاصله قطع کرد و یا حتی با شستشوی معده، دارو را از بدن خارج کرد، اما در صورت بروز حساسیت داروی تزریقی، اقدام خاصی نمی توان انجام داد. بنابراین عوارض داروهای خوراکی بسیار کمتر از انواع تزریقی است و همواره در علم پزشکی توصیه میشود که از درمان های تزریقی کمتر استفاده شود.



عوارض مصرف داروهای تزریقی :

۱- مصرف فرآورده های تزریقی می تواند باعث آسیب به عصب در محل تزریق، آسیب به عروق در محل تزریق، آبنه یا سایر عوارض در محل تزریق، خون مردگی و خونریزی های زیر پوستی، ایجاد زخم و باقی ماندن جای آن در محل تزریق شود.

۲- احتمال انتقال بیماری های عفونی مانند هپاتیت B، هپاتیت C و ایدز در میان بیماران، کادر درمانی و عموم جامعه در اثر تزریق های غیر ضروری افزایش می یابد. بدیهی است یکی از راه های پیشگیری از انتقال این بیماری ها، کاهش تجویز و مصرف غیرضروری داروهای تزریقی می باشد.

۳- کنترل و درمان عوارض ناشی از داروهای تزریقی، در بسیاری از موارد، نسبت به سایر اشکال دارویی مشکل تر می باشد. لذا به منظور پیشگیری از بروز این قبیل عوارض، از تجویز و مصرف غیر ضروری داروهای تزریقی خودداری فرمایید.

۴- به هنگام تجویز یا تزریق داروهای تزریقی، حتما نام فرآورده را مجددا از روی برچسب فرآورده بخوانید تا از تزریق اشتباهی فرآورده دیگر پیشگیری شود.

۵- به هنگام تجویز یا تزریق یک داروی تزریقی، حتما در رابطه با سابقه ابتلا به هرگونه عارضه دارویی نسبت به داروی مورد نظر از بیمار سوال فرمایید زیرا بروز مجدد آن عارضه می توان کشنده یا تهدید کننده حیات باشد.

۶- مصرف بی رویه داروهای تزریقی به دلیل نیاز به پرسنل آموزش دیده و

تجهیزات خاص جهت تزریق،

هزینه تقبل شده توسط بیمار و

سیستم بهداشتی را افزایش

می دهد.

