



آشنایی با مسمومیت

ناشر: آرسهء مصرف

مما ادم خدر و ممداد فیروز



دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی
شهید صدوقی نژاد

معاونت غذا و دارو

مرکز اطلاع رسانی دارو و سموم



مسمومیت با مواد مخدر یکی از علل مهم مرگ ناگهانی از مسمومیت های شیمیایی در بسیاری از کشورها است.

مصرف همزمان مواد مخدر با برخی از داروهای خواب آور و آرام بخش می تواند سبب بروز مسمومیت های تشدید و حتی مرگ در فرد مصرف کننده گردد.



استعمال سیگار در نوجوانان و جوانان، اولین گام در جهت حرکت به سوی اعتیاد و سوء مصرف مواد است.

استعمال سیگار سبب بروز انواع سرطان مانند سرطان مری، ریه، مثانه می شود.

امتحان کردن مصرف مواد در جمع دوستان و از روی کنجکاوی، آغاز حرکت در مسیر بی بازگشت اعتیاد است.



فرآورده های تقلبی تمجیزک و نورجیزک، نه تنها سبب ترک اعتیاد نمی شوند بلکه در اغلب آنها مواد سمی و کشنده وجود دارد.

فرآورده های مخدر و اعتیاد زای پانپراگ برخلاف ادعای مطرح شده مبنی بر خوشنوی و بی خطر بودن آنها، با ترک سیگار، سبب بروز اعتیاد می گردند.



استفاده از مواد مخدر تزریقی سبب اثربخشی سریع ماده مخدر شده و احتمال بازگشت و بهبودی وضعیت بیمار در صورت مسمومیت با آن را کاهش می دهد.

تزریق مواد مخدر از طریق سرنگ های آلوده، غیر استریل و مشترک با خطر بروز انواع بیماری های عفونی خطرناک مانند ایدز و هپاتیت همراه است.



یکی از عوارض روانی سوء مصرف استروئیدهای آنابولیک در جوانان، پرخاشگری و بروز رفتارهای ضد اجتماعی می باشد

مصرف انواع داروهای هورمونی با هدف بدنسازی در جوانان می تواند سبب بروز عوارض وخیمی مانند عقیمی، نارسایی قلبی و کبدی، کوتاهی قد و بزرگ شدن سینه در مردان و پرمویی و خشونت صدادار خانمها گردد.

آیا می دانید در طول تاریخ رواج مصرف مواد مخدر با هدف استعمال ملتها صورت گرفته است ؟

افزایش سطح آگاهی در مورد عوارض و پتانسیل اعتیاد و آموزش صحیح پیگیری از بروز سوء مصرف مواد، اساسی ترین گام در مبارزه با این بلای خانمانسوز است.



مشکلات خانوادگی، طلاق، بیکاری، فقر و بحرانهای روحی از عوامل مستعد کننده فرد به سوء مصرف مواد می باشند.

هر گونه تغییرات رفتاری غیر عادی و ناگهانی مانند گوتنه گیری، بی خوابی، بی حوصلگی، پرخاشگری، غیبت از محل کار و تحصیل، بی نظمی و ناامیدی در فرزندان خود را جدی گرفته و در پی بررسی علت آن باشید.



آیا می دانید بر اساس گزارشات موجود مصرف حتی یک عدد قرص اکستازی، منجر به مرگ شده است ؟

سکته های قلبی و مغزی، تشنج، نارسایی کبد و کلیه و تخریب سلولهای مغزی و عضلانی از عوارض مسمومیت با قرص اکستازی می باشند.



ناخالصی های موجود در انواع مواد مخدر، در برخی موارد از خود ماده مخدر مرگبارتر می باشند.

وجود ناخالصی در ماده مخدر احتمال تشخیص مواد موثره موجود در آن را از بین برده و بعضا مانع از امداد رسانی و مسمومیت زدایی مناسب می گردد.



مصرف نابجای استروئیدهای آنابولیک در جوانان جهت بدنسازی و رقابت های ورزشی با خطر بروز عوارض قلبی و عروقی مانند ازدیاد فشار خون و نارسایی قلبی همراه است.

موارد متعددی از مرگ های ناگهانی در اثر سوء مصرف داروهای نیروزا در ورزشکاران حرفه ای در جهان گزارش شده است.

